

PREMAZKO ANTISORGAILUA ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA




arrazola
FARMACIA



**Zure farmazia
Grosen**

**Tu farmacia
en Gros**

Secundino Esnaola 21 (Gros)
20001 Donostia/San Sebastián
T.: 943 283 434
farmaciaarrazola@farmanorte.org

-
Whatsapp bidezko eskaerak/
Pedidos por whatsapp
618 164 766

www.farmazia-arrazola.eus

Osasun gomendioak

- Pilula ahalik eta azkarren hartu (lehen 3 egunetan), eraginkortasuna gutxitzen delako denborarekin.
- Pilula hartu eta 3 ordutara botaka egingo bazenu, beste dosi bat hartu behar duzu.
- Ez beldurtu baginatik odola botatzen baduzu, titietako edota buruko mina baduzu edo botaka egiten baduzu.
- Hilerokoa aurreratu edo atzeratu daiteke. 7 egun baina gehiago atzeratuko balitz, medikura joan.
- Ohiko antikonzeptiboarekin jarraitu dezakezu edo edozein antikonzeptibo hartzen hasi zaitezke berehala.
- Tratamendu hau ez da OHIKO ANTIKONTZEPTIBO bezela erabili behar.
- PRESERBATIBOA DA SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK SAIHESTEN DITUEN METODO ANTIKONTZEPTIBO BAKARRA.

Recomendaciones sanitarias

- Toma la pastilla lo antes posible (3 primeros días tras la relación sin protección), porque con el transcurso del tiempo disminuye su eficacia.
- Si vomitas en las 3 horas siguientes a la toma del medicamento, debes tomar otra dosis.
- No te asustes si tienes sangrado vaginal, dolor de mamas y de cabeza, náuseas o vómitos.
- Puede que la regla se adelante o se retrase. Si se retrasa más de 7 días, acude a tu centro de salud.
- Puedes reanudar el uso del anticonceptivo habitual o comenzar a usar cualquier anticonceptivo de inmediato.
- Este tratamiento NO SE DEBE USAR como ANTICONCEPTIVO DE RUTINA.
- Recuerda que EL PRESERVATIVO ES EL ÚNICO MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE EVITA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

*Galderarik baduzu, gurekin harremanetan jarri.
Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotras.*